

Torbiera di Casasola

id: 165

Coordinate Gauss-Boaga (fuso Est)	X: 2371443	Y: 5117776
Coordinate WGS84	lat 46° 11' 49.67"	long: 13° 4' 28.39"
Quota (m)	min: 158	max: 168
Località	Casasola	
Comuni interessati	MAJANO	
Posizione	Emerso	
Grado d'interesse	Regionale	
Tipo di studio:	Bibliografico	
Interesse scientifico	Geomorfologia Idrogeologia Naturalistico	
Giudizio	Si tratta di una torbiera posta al limite settentrionale dell'anfiteatro morenico. La sua genesi è quindi particolare e diversa da quelle delle torbiere intermoreniche.	
Periodo di visita	Tutto l'anno	
Descrizione	<p>L'area della torbiera di Casasola si estende a settentrione delle strada comunale Majano – Casasola. E' limitata a Nord dal corso del Fiume Ledra e nei restanti lati da rilievi collinari morenici. Si tratta di una depressione approssimativamente ellittica, con asse maggiore E-W, lungo meno di 1 km, i cui limiti coincidono con l'isoipsa 160. Nei suoi punti più depressi e centrali la superficie topografica si abbassa a 158 m.</p> <p>L'alimentazione delle torbiere è legata alle risorgive più meridionali del campo di Osoppo, infatti la falda freatica qui è sub-affiorante (0-2 m dal piano di campagna).</p> <p>La genesi della torbiera di Casasola, a sua volta condizionata dalla sua posizione geografica, è quindi diversa da altre torbiere del Friuli morenico (ad esempio I Quadri di Fagagna o la palude di Cimano). Si tratta di una depressione lungo il bordo meridionale del Campo di Osoppo in cui il deflusso generale delle acque verso Sud viene sbarrato dalla presenza dei rilievi morenici dell'anfiteatro, sovrainposti ai depositi del Miocene superiore, provocando la risorgenza e, talora, il ristagno delle acque. L'area rappresenta una forma relitta post-wurmiana ancora abbastanza evidente risparmiata sia da bonifiche che da riordini fondiari ad essa contigui. La sua genesi probabilmente va ascritta ad uno o più anse abbandonate del Ledra, fiume che in questo tratto meandreggiava e che con interventi anche recenti (XIX secolo) è stato arginato e ridotto a drizzagno.</p> <p>L'ambiente di torbiera rappresentano un ecosistema particolare per quanto riguarda gli aspetti floristici che quelli faunistico. Per questo motivo la Regione ha inserito la torbiera di Casasola nell'elenco dei Biotopi naturali regionali. L'area vincolata ha un'estensione di 48.4 ettari.</p>	

Torbiera di Casasola

id: 165

Valutazione d'interesse	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Rappresentativo	<input checked="" type="checkbox"/> Esemplificativo
Esposizione	<input checked="" type="checkbox"/> Naturale	<input type="checkbox"/> Artificiale	
Visibilità	<input type="checkbox"/> Punto panoramico	<input type="checkbox"/> Punto visibile da lontano	
Accessibilità	A Piedi	Facile	
Note	Facile accesso, attraverso carrarecche da Majano e da Casasola, la cui percorribilità è condizionata dal livello della falda.		
Stato di conservazione	Medio		
Proposta di tutela	Consigliabile		
Descrizione del degrado	L'antropizzazione dell'area circostante è intensa		
Note su vincoli e zonazione	Il geosito è quasi interamente Sito di Importanza Comunitaria; gran parte del suo areale è interessato da prati Stabili (D.G.R. 14.09.07 n. 2166).		
Commenti aggiuntivi			
Bibliografia	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (2005) - Aree Naturali Protette nel Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, 256 pp.		



Canneto ai margini della torbiera (fonte: Furio Finocchiaro)



La parte settentrionale del biotopo (fonte: Furio Finocchiaro)



Un piccolo canale all'interno del biotopo (fonte: Furio Finocchiaro)